

Du fait de votre traitement, nous devons mettre en place un accès veineux central avec chambre implantable (PAC). Il s'agit d'un petit réservoir (chambre) placé sous la peau et raccordé à un tuyau (cathéter) introduit dans une veine jugulaire le plus souvent (sous-clavière ou autres veines parfois). Ce geste est couramment réalisé sous anesthésie locale par les médecins anesthésistes ou des infirmières formées (plus de mille fois par an au Centre L. Bérard). Cet acte est systématiquement effectué dans une salle prévue à cet effet (au bloc opératoire) afin d'éviter les risques infectieux et de bien positionner le cathéter.

Département d'anesthésie réanimation

Dr Edouard Aubert  
Dr Georges Romero  
Dr Henri Sebban  
coordonnateurs du département

Secrétariat  
Tél.: 04 78 78 27 53



Un certain nombre de conditions sont nécessaires afin que ce geste se passe au mieux pour vous et afin que ce dispositif puisse servir aussi longtemps que possible pour votre traitement.

Vous voudrez donc bien signaler le plus tôt possible si vous présentez :

- Une allergie aux anesthésiques locaux, à l'iode ou aux produits de contraste de radiologie.
- Un état infectieux, de la fièvre ou un traitement antibiotique,
- Des antécédents de chirurgie au niveau du cou ou au niveau du thorax,
- Des traitements anticoagulants (HEPARINE, PREVISCAN®, SINTROM®...) ou anti-agrégants plaquettaires (par exemple TICLID®, ASPIRINE à arrêter plus de 10 jours avant),
- Des antécédents de saignement anormal (par exemple lors d'opérations ou dans votre famille),
- Des problèmes pulmonaires,
- Un système implanté (pacemaker, valve de dérivation du liquide céphalo-rachidien par exemple).
- Si vous pratiquez un sport ou une activité mettant à risque le système du fait de sa position (voir au dos : chasse par exemple)
- Si vous avez eu ou devez avoir une radiothérapie ou une chirurgie du cou ou du thorax.
- Si vous êtes en aplasie (taux de globules blancs bas) ou risquez de l'être dans les 10 jours à venir du fait de vos traitements.


### Pour l'intervention

Il n'est pas utile d'être à jeun. Il sera nécessaire de rester allongé pendant 30 à 60 minutes pendant la pose et vous pourrez à tout moment discuter avec le médecin responsable.


Demandez dans le service, avant de descendre au bloc opératoire, un calmant pour votre angoisse, vos douleurs, vos nausées ou vomissements si vous croyez ne pas pouvoir supporter confortablement de rester dans cette position allongée.

La chambre sera donc située sous la peau du thorax au dessus du sein. La veine sera ponctionnée à la base du cou. La mise en place de la chambre nécessite une courte incision de 3 à 4 cm sous anesthésie locale. Des points seront à enlever après 7 à 10 jours. Le bon fonctionnement du système est vérifié lors de la pose. Le système est utilisable immédiatement pour les traitements. Un pansement est laissé en place jusqu'à l'ablation des points.

Les problèmes lors de la mise en place sont généralement très rares (moins de 1%) si les conditions requises dans le texte ci-dessus ont été satisfaites.



Lors de la mise en place, il peut arriver exceptionnellement que la ponction veineuse atteigne des éléments de proximité (par exemple plèvre pour la voie sous-clavière avec risque de pneumothorax, risque de saignement,...). Le PAC est cependant un corps étranger sur lequel une infection peut se fixer, ou une phlébite survenir. Vous devez donc signaler toute douleur locale intense, tout gonflement anormal, rougeur, écoulement au niveau du site, toute fièvre ou frisson, toute gêne respiratoire, tout gonflement d'un bras, du visage ou du cou.



Voici en coupe le système qui sera mis en place. Il est ponctionné par une aiguille spéciale à chaque utilisation. L'aiguille ne doit pas être laissée en place plus de 5 jours sans être changée. Un rinçage régulier peut être nécessaire et vous sera alors prescrit.

Un carnet de suivi doit vous être remis. Vous devez le porter sur vous et le présenter à toute personne désirant utiliser ce système, ceci afin que les règles de bonne utilisation et d'entretien soient respectées. Toutes les manipulations doivent être consignées sur ce carnet de suivi.

Les traitements que vous recevez diminuent souvent les capacités de défense contre les infections. Rappelez le service en cas de fièvre ou de frissons et pensez à signaler votre système et présenter votre carnet à chaque fois. N'oubliez donc pas de récupérer votre carnet et de toujours l'avoir avec vous.

Ce système ne contre-indique pas le port de la ceinture de sécurité. Il convient cependant d'éviter les mouvements violents répétés (fendre du bois par exemple), d'éviter les chocs (recul de fusil par exemple).