



MESOPATH

Procédure de certification du mésothéliome en France

Le mésothéliome est une maladie à **déclaration obligatoire** (médecin en charge du patient) auprès de l'ARS de votre région : <http://www.invs.sante.fr>

Le diagnostic de mésothéliome est certifié par un réseau d'experts

Circuit de certification différent selon la localisation tumorale : thoracique ou abdomino-pelvienne

Toute **suspicion de mésothéliome** est à adresser à un expert régional qui doit confirmer le diagnostic et transmettre au Centre National Référent MESOPATH (Lyon CLB) pour la poursuite du processus de certification



Localisation thoracique


Plèvre et péricarde

Experts pathologistes régionaux

MESOPATH NETMESO

<http://www.mesoclin.fr>

AVEROUS G. (Grand Est) CHU Strasbourg
BEGUERET H. (Nouvelle-Aquitaine) CHU Bordeaux
CAZES A. (Ile-de-France) AP-HP Bichat, Paris
CHALABREYSSE L. (Auvergne-Rhône-Alpes) HCL Lyon Est
COPIN MC. (Pays de la Loire) CHU Angers
DAMOTTE D. (Ile-de-France) AP-HP Cochin, Paris
FOREST F. (Auvergne-Rhône-Alpes) CHU Saint-Etienne
FOULET-ROGE A. (Pays de la Loire) CH Le Mans
GIUSIANO-COURCAMBECK S. (PACA-OUEST/Corse) AP-HM Marseille
HOFMAN V. (PACA-EST/Corse) CHU Nice
HUMEZ S. (Hauts-de-France) CHU Lille
LANTUEJOUL S. (Auvergne-Rhône-Alpes) CLB Lyon
PLANCHARD G. (Normandie) CHU Caen
PITON N. (Normandie) CHU Rouen
ROUQUETTE I. (Occitanie) Centre de Pathologie des Côteaux, Toulouse
ROUVIER P. (Ile-de-France) AP-HP La Pitié Paris
SAGAN C. (Pays de la-Loire) CHU Nantes
VIGNAUD JM./POUGET C. (Grand Est) CHU Nancy



Localisation abdomino-pelvienne

Péritoine et vaginale testiculaire

Experts pathologistes régionaux

RENA-PATH

<http://www.renape-online.fr>

AVEROUS G. (Grand Est) CHU Strasbourg
BENZERDJEB N. (Auvergne-Rhône-Alpes) HCL Lyon Sud
DARTIGUES P. (Ile-de-France) IGR, Villejuif
FONTAINE J. (Auvergne-Rhône-Alpes) HCL Lyon Sud
ISAAC S. (Auvergne-Rhône-Alpes) HCL Lyon Sud
MERY E. (Occitanie) CHU Toulouse
VALMARY-DEGANO S. (Auvergne-Rhône-Alpes) CHU Grenoble
VERRIELE-BEURRIER V. (Pays de la Loire) ICO Angers

Toute suspicion de mésothéliome doit être adressée à un pathologiste expert régional (renseignements cliniques, lames, bloc et CR initial)